

Austatud lapsevanem!

Palun tutvuge alljärgneva infoga ning täitke seejärel lehel 2 asuv NÕUSOLEKU VORM.

Mis on COVID-19? Millised on COVID-19 sümptomid?

COVID-19 haigust põhjustab koroonaviirus. Koroonaviirus levib enamikel juhtudel piisknakkusena (kõhimisel, aevastamisel) ja otsekontakti kaudu. Viirus võib levida ka saastunud pindade kaudu.

COVID-19 sümptomid ja ka haiguse kulg avalduvad erinevalt. Haigus võib kulgeda ilma haigustunnusteta, kergete või raskete sümptomitega, lõppedes halvimal juhul surmaga.

Peamised sümptomid on peavalu, köha, palavik, hingamisraskused, kurguvalu, nohu, lihasvalu, maitsemeelte kadu, haistmismeelte kadu, väsimus ja nõrkustunne. Rohkem infot sümptomite kohta leiab Terviseameti kodulehelt¹. Täpsemat infot võimalike sümptomite kohta jagab ka vaksineerimist läbiviiv kooli tervishoiuteenuse osutaja.

Vaksineerimine

Vaksineerimine on tervishoiuteenus, mis on avatud kõigile inimestele alates 12. eluaastast. Rohkem infot vaksineerimise kohta leiab vaktsineeri.ee lehelt.

Koolikeskkonnas korraldab vaksineerimisi kooli tervishoiuteenuse osutaja. Alaealist vaksineeritakse koolikeskkonnas ainult vanema või eestkostja nõusolekul.

Õpilaste vaksineerimisel kasutatakse [Comirnaty](https://vaktsineeri.ee/comirnaty) (Pfizer/BioNTech)² või [SpikeVax](https://vaktsineeri.ee/spikevax) (Vaccine Moderna)³ vaktsiini. Lisainfo vaktsiini Comirnaty (Pfizer/BioNTech) ravimiteabe kohta leiab ka vaktsineeri.ee lehelt ja vaktsiini SpikeVax (Vaccine Moderna) ravimiteabe kohta samuti vaktsineeri.ee lehelt. Kasutatava vaktsiini osas jagab infot ka vaksineerimist läbiviiv tervishoiutöötaja. Vaksineerimise käigus tagatakse lapsele põhjalik nõustamine ja antakse vaktsiini pakendi infoleht.

Üks süst tehakse lapsele, kui laps on koroonaviiruse läbi põdenud (6. kuul või hiljem pärast tervenemist). Lapsele tehakse kaks süsti, kui ta pole põdenud haigust läbi. Sõltuvalt vaktsiinist on kahe doosi vaheline intervall erinev: Comirnaty (Pfizer/BioNTech) vaktsiini puhul 6 nädalat ja SpikeVax (Vaccine Moderna) puhul 28 päeva.

Vaksineerimise järel peab laps viibima vaksineerimiskohas kooli tervishoiutöötaja jälgimise all vähemalt 15 minutit. Vaktsiini teise doosi aja teatab kooli tervishoiuteenuse osutaja lapsele ja Teile pärast lapse esimese doosi registreerimist.

Vaksineerimise järgselt võivad esineda kõrvaltoimed. Tüüpilisemad COVID-19 vaktsiinide kõrvaltoimed on süstekoha valu ja turse, peavalu, palavik, halb enesetunne, väsimus, iiveldus, oksendamine, suurenenud lümfisõlmed, lihasvalu, liigesvalu, kõhulahtisus. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.

Väga harva esineb pärast vaksineerimist teatud müokardiidi ja perikardiidi juhte, mille sümptomiteks võivad olla hingamisraskus, südamepekslemine, ebaregulaarne südamerütm ja valu rindkeres. Vastavate sümptomite tekkel tuleb koheselt pöörduda arsti poole.

Kõrvaltoimete osas leiab rohkem infot Terviseameti kodulehel⁴, seda jagab ka vaksineerimist läbiviiv kooli tervishoiuteenuse osutaja.

Kooli tervishoiuteenuse osutajale võiks teada anda kõigist võimalikest lapsel ilmnevatest kõrvaltoimetest vaksineerimise järgselt. Kooli tervishoiuteenuse osutaja edastab kõrvaltoime kohta teatise Ravimiametile. Lapsevanem võib Ravimiametile kõigist kõrvaltoimetest ka ise teatada, kasutades vastavat [vormi](https://vaktsineeri.ee/vormi)⁵. Kõrvaltoimete tekkides võib konsulteerida ka perearstiga või helistada perearsti nõuandeliinile, telefonil 1220.

Nõusoleku tagasivõtmine

Teil on õigus oma nõusolek tagasi võtta, esitades nõusoleku tagasivõtmise avalduse kirjalikus vormis kooli tervishoiuteenuse osutajale.

Käesoleva nõusoleku vormi töötas välja Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Terviseameti, Haigekassa ja Andmekaitse Inspektsiooniga.

¹ <https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus>.

² <https://vaktsineeri.ee/covid-19/covid-19-vaktsiinid/pfizer-biontech/>.

³ <https://vaktsineeri.ee/covid-19/covid-19-vaktsiinid/moderna/>.

⁴ <https://vaktsineeri.ee/covid-19/covid-19-vaktsiinid/moderna/#t-covid-19-vaccine-moderna-voimalikud-korvaltoimed> ja <https://vaktsineeri.ee/covid-19/covid-19-vaktsiinid/pfizer-biontech/#t-comirnaty-voimalikud-korvaltoimed>.

⁵ <https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiini-k%C3%B5rvaltoimest-teatamine>.

NÕUSOLEKU VORM LAPSEVANEMALE/EESTKOSTJALE LAPSE COVID-19 VASTU VAKTSINEERIMISEKS⁶

Enne nõusoleku vormi täitmist palun tutvuge infoga lehel 1.

TÄIDAB KOOLI TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJA

Kooli tervishoiuteenuse osutaja (nimi, telefon ja e-posti aadress):

viib läbi Covid-19 vastu vaktsineerimise (kuupäev ja asukoht): _____

Vaktsineerimiseks kasutatakse vaktsiini (kasutatav(ad) vaktsiin(id) märgitud):

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

SpikeVax (Vaccine Moderna)

TÄIDAB LAPSEVANEM/EESTKOSTJA

Annan nõusoleku

minu lapse/eestkostetava (ees- ja perekonnanimi): _____

lapse isikukood: _____

COVID-19 vastu vaktsineerimiseks.

Kui kooli tervishoiutöötaja on märkinud, et vaktsineerimise päeval kasutatakse kahte erinevat vaktsiini, siis soovin, et minu lapse vaktsineerimiseks kasutatakse vaktsiini (palun märgi üks):

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

SpikeVax (Vaccine Moderna)

Kuupäev: _____

Lapsevanema/eestkostja ees- ja perekonnanimi: _____

Lapsevanema/eestkostja allkiri: _____

(allkirjastatud digitaalselt või paber kandjal)

⁶ Nõusoleku küsimise ja andmete töötlemise õiguslik alus: sotsiaalministri 13.08.2010 määruse nr 54

„Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“ § 2 lõige 4, võlaõigusseaduse § 766 lõige 3, § 769.